



Kyosho

Sårbare punkter

Angreb	Ufarlig	Farlig	Livsfarlig	Beskrivelse
Fingergreb mod mundens muskulatur under næsen	X			Smertefuldt.
Fingergreb i mundvigene	X			Smertefuldt.
Fingergreb og tryk på kappe muskelen	X			Smertefuldt.
Fingergreb på lårets inderside	X			Smertefuldt.
Fingertryk på underkæbens sider mod spytkirtlen		X		Lukker for blodforsyningen. Længere tryk kan give hjerneskade.
Fingertryk bag øreflipperne (ørenerven).		X		Smertefuldt. Man kan besvime eller blive svimmel.
Fingertryk mod siden af næsen, fra overgang fra bruske til ben		X		Kan brække næse-brusken og få åndedrætsbesvær.
Fingertryk mod øjnene		X		Lav hjertefrekvens, lav puls og ødelægge øjnene.
Fingertryk oven for brystbenets start		X	(X)	Man kan skade luftrør. Ved længere tryk er det livsfarligt.
Dobbelt fingertryk forfra mod struben			X	Risiko for at knuse strubehovedet, medfører kvælning.
Fingertryk mod armhulens nerver, sener og blodkar		X		Nervelæsion, lammelse.
Fingerstik mod øjnene		X		Varige øjenskader.
Fingerstik mod maven i regionen 10 cm over navlen og nedefter		X		Risiko for tarmlæsion
Knostød mod underkæben fra siden		X		Kæbebrud, besvimelse.
Knostød umiddelbart under brystbenet (solar plexus).		X		Risiko for maveperforation
Knostød/fingerstik mod lymfer i armhule		X		Risiko for lammelse i armen. Ved varig læsion kan man få "elefantarme"
Knostød mod nederste del af højre ribbenslinje (leveren)		X	(X)	Leverlæsioner, kan medføre død.
Knostød mod milten til venstre og nedenunder brystbenet			X	Miltlæsion, risiko for forblødning.
Knostød/spark mod hjerteregionen			X	Hjertestop, hjerteflimren
Knostød mod øvre del af brystet		X		Risiko for lungeperforation
Knostød mod overkæben		X		Kæbebrud, dobbelt syn
Knostød mod øreknoglen		X		Hjerne rystelse, (lille mulighed for kraniebrud)
Uppercut mod næsen		X		Næsebrud, risiko for hjerneblødning og rystelse
Albuestød mod næseryggen som cirkelbevægelse		X		Næsebrud, risiko for hjerneblødning, hjernerystelse

Angreb	Ufarlig	Farlig	Livsfarlig	Beskrivelse
Albuestød mod spark mod rygsøjlen.		X		Risiko for brud, lammelse
Albuestød mod hagen		X		Brud, hjernerystelse.
Hovedstød med pande eller nakke mod næsen		X		Næsebrud, hjernerystelse
Knæstød mod skridtet		X		Blødninger, sterilitet
Knæstød mod halebenet		X		Hjernerystelse, brud
Tramp mod mellemfods-/fodrods knoglerne		X		Brud
Spark mod siden af knæet		X		Ledbåndsskader, varige ustabile knæ, slidgigt.
Spark mod knæskallen		X		Ledbåndsskader, går ud af led.
Spark mod nyrene		X	(X)	Smadrede nyrer, nyreskader, hvis begge nyrer er det livsfarligt.
Cirkelspark mod indersiden af låret, under lysken.		X		Større blødninger i låret, styringsbesvær.
Håndfladeslag mod begge ører		X		Blødninger, nedsat hørelse.
Håndflade/ryg slag mod siden af ansigtet.	X			Smertefuldt.
Håndkantslag mod kraveben.		X		Brud, indre blødninger.
Håndkantslag mod siden af halsen.			X	Risiko for blodtryksfald, hjertestop.
Håndkantslag mod fontanelen.			X	Risiko for hjerneblødning.
Håndkantslag mod nakken			X	Risiko for brud på halshvirvler, risiko for ophørende vejrtrækning. Smertefuldt, blå mærker.
Håndkantslag mod muskulatur (generelt).	X			
Håndkantslag mod struben.			X	Øjeblikkelig kvælning.
Håndkantslag på overarmen.	X			Kortvarige føleforstyrrelser.
Riv i håret.	X			Smertefuldt.
Nap på brystvorten	X			Smertefuldt.
Nap på øreflippen.	X			Smertefuldt.
Bid i næsen.	X			Smertefuldt, ufarligt så længe næsen ikke bides af.
Bid i øret.	X			Smertefuldt, ufarligt så længe øret ikke bides af.
Strangulering på de store halspulsårer.			X	Besvimelse, ved længere strangulering hjernedød.
Strangulering på nyrene.		X		Varige nyreskader.
Strangulering på forsiden af halssiden.			X	Kvælning.